

CARBAMAZEPINE (卡马西平)

TEGRETOL® (癲通/得理多)

病人须知

此传单为您解答一些关于此药物的疑问，但并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

此药有什么用途？

Carbamazepine 用于控制癲痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他疾病。

何时服用此药？

- 通常每日口服二，或三次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地增加剂量。请遵守标签上的指示按时规律地服用药物，若有疑问，请向药剂师或医生询问。
- 在未经医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

如何服用此药？

- 药水
服用前先将药水摇匀。请使用药房提供的茶匙或注射管来喂药。请勿使用家用汤匙量药水，因为家用汤匙不能准确地量出剂量。
- 普通药片(比如：Tegretol® 200mg)
将整粒药片与一杯开水吞服。
- 延长释放剂型药片(比如：Tegretol CR®)
这种特别剂型能在固定的时间内让药物慢慢地释放，因此能减少服用药物的次数。应将整粒药片与水服下。若您的孩子无法将整粒药片吞下，您可将药片折半，再让孩子服下。请勿将药片咬碎或磨碎。

忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，便勿须补服。请依照下次服药的时间服药便可。
- 请勿连续服用两剂或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。
- 若您的孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在孩子刚开始服药时出现。常见的副作用包括：

- 嗜睡，头晕，头疼
若服用其他药物要特别小心； 伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。当孩子进行骑脚车、游泳或其他类似活动时， 家长必须谨慎督促。
- 恶心、呕吐、肚痛、食欲不振、口渴、腹泻或便秘
若觉得肠胃不适， 药物可与食物一起服用。
- 行为异常，如思绪混乱、焦虑
- 乏力、背或肌肉疼痛

若以上副作用在几天后仍没有消失， 或影响孩子的日常生活， 请告知医生。
若孩子出现过度昏睡、呕吐、视线模糊、动作不协调， 请立即带您的孩子复诊， 因为孩子可能对此药比较敏感， 可能需调整剂量。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用， 请立即通知医生或到急诊部求医：

- 持续发烧，喉咙痛，口疮
- 淤血，或不寻常的出血，病情迅速恶化
- 皮肤或眼睛泛黄（黄疸）
- 史蒂芬斯-强森症候群（Stevens-Johnson syndrome, SJS）

史蒂芬斯-强森症候群是一种致命性的皮肤水疱疾病。它的主要特症包括了皮肤红疹，口腔多处破皮，水疱状的皮肤疹，发烧，搔痒及其它的症状。
这种症状通常是发生在治疗期间的前几个月（特别是在前3个月的治疗必需密切观查）。若服用此药物超过3个月以上又没有上述的皮肤反应，得到此症候群的机率是低的。
因为这种症状的病情会迅速恶化，一旦病患有出现皮肤的症状时，家长要马上带病患来医院来看医生。

若服用药后出现其他不寻常的现象， 请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问或困难， 请与您的医生讨论。

其他资讯

在让孩子服用其他药物、补品或草药前， 请告知医生或药剂师。

若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊， 请告知医生孩子在服用此药物。

注：抗生素如 erythromycin (红霉素)、clarithromycin (克拉霉素)、azithromycin (阿奇霉素)，葡萄柚及含葡萄柚的产品要避免与 carbamazepine 并用。

因为某些患者在服用 carbamazepine 后， 患上的风险较高。因此新加坡卫生科学局(HSA)规定所有患者在首次服用 carbamazepine 前， 都需要接受基因检验。请向您的医生或药剂师查询， 以或得更多有关详情。



Version 1

Last Review: 01/08/2014

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®