

# 阿哌沙班 (Apixaban)


## (Eliquis™)

---

### 病人资料单张

本传单回答了有关阿哌沙班 (Apixaban) 的一些常见问题。它不包含所有可用的信息。它也不能代替与你的医生或药剂师交谈。

阿哌沙班(Eliquis®)是一粒药丸。剂量分为 2.5 毫克(mg) 和 5 毫克(mg)。



### 什么是创新的口服抗凝血剂 (direct-acting oral anticoagulants (DOACs))?

阿哌沙班 (Apixaban) 是一种创新的口服抗凝血剂 (direct-acting oral anticoagulants (DOACs)), 即新一代薄血药。

阿哌沙班 (Apixaban) 用于抑制血块的形成, 以及防止已形成的血块继续扩大。但它并不能化解已形成的血液凝块, 这些血块须由身体自然化解。

您不需要经常抽血检验以确保药物的功能。您的医生可能会检验您的肾或肝功能。如您有肾或和肝衰歇, 您不适合服用阿哌沙班 (Apixaban)。

### 为什么要服食阿哌沙班 (Apixaban) ?

医生要您服食此药是基于以下其中的病况 (请在适当的选框打勾):

- 预防中风因为心律失常
- 预防血液结块在髋关节或膝盖置换手术
- 治疗或预防深静脉血栓 (血液结块在脚血管)
- 治疗或预防肺部内血液结块

其他: \_\_\_\_\_

治疗期因病况而异, 有些需要三到六个月, 有些需要更长久的治疗。

### 何时服用阿哌沙班 (Apixaban) ?

- 阿哌沙班需服用一天两次。

### 如何服用阿哌沙班 (Apixaban) ?

- 阿哌沙班 可以饭前或饭后服食。
- 每天按时在同一时间服用阿哌沙班, 按照您医生的指示。
- 除非是您的医生或药剂师的吩咐, 不然切勿忘记吃药, 加倍服用, 自行更改或停服剂量。
- 您必须知道阿哌沙班 的图像, 剂量和给您的用处。
- 请时常确保储存的份量足够。

## 忘了服食阿哌沙班（Apixaban）该怎么办？

如果您忘了服食，尽快服用此药。

## 服食阿哌沙班（Apixaban）时有那些副作用？必须采取什么行动呢？

服用阿哌沙班常见的副作用包括过敏反应和反胃。

- 阿哌沙班可能会造成流血现象的副作用如:-
- 在未受伤的情况下，出现流鼻血的症状
- 刷牙时，牙龈出血
- 割伤后，用加压 10-15 分钟后仍无法止血

行动方案：如血流 15 分钟后仍无法止血或您觉得不舒服，请与您的医生征询

- 女性经血过量

行动方案：服用阿哌沙班时，女性经血将会比往常较多。如您觉得不舒服，请与您的医生征询

服用过量阿哌沙班时所导致的严重副作用包括：

- 尿液有血或呈深暗、污浊颜色
- 粪便呈黑黏状（没有服食铁片素）
- 咳嗽时咯血或呕吐出类似咖啡渣的色物
- 在未受伤的情况下，皮肤出现大片的淤伤
- 突然严重头痛和呕吐或神智不清

行动方案：如有以上症状或您觉得不舒服，请即刻通知您的医生或马上到医院的紧急部门寻求医治。

## 服食阿哌沙班时须要知道的事项：

- 若认为自己已怀孕，可能会怀孕或正在哺乳，请立即向医生说明。
- 若您的病情或药物有任何改变，服用新的或替换草药或营养食品，请务必通知您的医生或药剂师
- 您会比较容易流血。刷牙时使用柔软的牙刷。当您使用剃刀或其它尖锐物体时，请加倍小心。
- 如您需动手术或牙科手术/治疗，请务必告知您的医生、牙医或药剂师您正在服用阿哌沙班。您可能需要在手术前停药阿哌沙班。

## 您应该如何保存药物？

- 请将药物放在阴凉，干燥，避免阳光直接照射的地方。
- 阿哌沙班需储存在原装片里。勿打开或合其他药片放在一个储存罐如药丸盒里。室温即可，避免阳光直接照射
- 把药物放在儿童拿不到的地方。



Version 1

Last Review: 30/06/2017

Produced by Department of Pharmacy  
of National Heart Centre of Singapore  
and

Singapore General Hospital

**PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®**